

โรคทุเบอร์คุโลสิส*

ในพระคำว่า “อโศกฯ ประมาณปาก” แปลว่าความปราศจากโรคเป็นลักษณะอันประเสริฐ เพราะฉะนั้น ผู้ที่รู้จักภารกษาตนให้พ้นจากโรคภัยได้ซึ่งเป็นผู้ประพฤติตูกุต้องพระธรรม และเคราะห์ที่ทำการรักษาตนให้พ้นโรคภัยนี้เป็นการที่ทำได้ มันอยู่โรคที่เราจะป้องกันไม่ได้จริงๆ แต่บางโรคก็กันง่าย บางโรคก็กันยาก

เหตุที่เรายังกำจัดโรคไม่ได้หมดก็เพราะยังไม่ได้รู้จักนิสัยของโรคทุกอย่างดีพอ เพราะฉะนั้นการกระทำให้ความรู้สึกกับโรคต่างๆ พร่อนลายทั่วทั้งกายทั้งใจเป็นการนำด้วยยังหนึ่ง

ทุกวันนี้เราก็อยมีความรู้สึก และกลัวทุกชื่อของโรคติดต่อของมนุษย์ แต่เรายังกลัวจะแพ้โรคซึ่งติดกันง่ายและเมื่อติดกันแล้วก็ตายทันตาเห็น เราหวาดลัวแผลโรคป่า鞠บันอย่างเดียว ซึ่งเจริญอยู่เป็นที่น่าสายตากว่าอย่างมาก แต่โรคเหล่านี้มักจะมาเป็นคุณ เพราะฉะนั้น เราก็ต้องท่าเตรียมการป้องกันได้ทัน ประดุจดังข้าศึกภายนอกเมื่อมันมาโจมตี เราก็ยังมีระดับความคุ้มครอง แต่ส่วนโรคติดต่อซึ่งมีอาการเรื้อรังนั้นเป็นขึ้นข้าว่า ไม่ทันรู้ตัวเมื่อเป็นแล้วก็เหลือแก้เปรี้ยบ เหมือนข้าศึกภายนอก หรือคนสอง阵营 หรือผู้ร้ายย่องติดหัว โรคติดต่อจะนินนีมีมากในหมู่พวกเรารู้ด้วยตัวเองได้ คือ โรคเรื้อน วัณโรค เป็นต้น ในที่นี้จะขอพறรณาถึงการแก้และกันวันโรคโดยจะเพาะ

ตามภาษาแพทย์เรียกวันโรคว่า “ทุเบอร์คุโลสิส” คือความอักเสบในร่างกายเนื่องด้วยพิษของเชื้อโรค ชนิดนี้ ซึ่งอยู่ในประเทาที่แพทย์รู้สึกขณะแล้ว และอาจเห็นได้ด้วยใช้กล้องขยาย แต่ชาวบ้านเรียกโรคนี้ว่าฝีในห้อง เป็นคำไม่ตรงต่ออาการของโรค เพราะคนเจ็บไม่ได้เป็นฝี แม้เชื้อ ทุเบอร์คิล อาจเข้าไปทำให้ห้องอักเสบได้ ส่วนคำว่าวันโรคนั้นก็แสดงอาการอย่างหนึ่งของโรคนี้ท่านนั้น คือ ผิวเสีย แต่โรคอื่นก็อาจทำให้ผิวเสียได้เพราจะนั้น ในที่นี้จะขอเรียกโรคตามตำราแพทย์ว่า “ทุเบอร์คุโลสิส”

ทุเบอร์คุโลสิส เป็นโรคเกิดขึ้นด้วยเชื้อโรคเข้าไปในร่างกาย ทั้งเป็นโรคติดต่อจากคนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่งได้ โรคนี้เป็นได้ทั่วทุกอวัยวะ แต่โดยมากมักจะจับที่ปอดข้างหนึ่งก่อน แล้วตามไปอีกข้างหนึ่ง ทำให้คนตายเพราปอดเน่าและพิษเข้าไปในโลหิต

อาการ

โรคทุเบอร์คุโลสิส เป็นโรคที่สังเกตได้ยากในคนที่เจ็บใหม่ๆ เพราะโรคนี้เกิดเป็นขึ้นข้าว่า ไม่ทันรู้สึกตัวว่า เจ็บ คือเป็นที่ละเล็กละน้อย โดยมากขึ้นต้นด้วยเป็นหวัด ตัวร้อน หรือเป็นโรคอื่นก่อน ครั้นหายแล้วทุเบอร์คุโลสิส ย่องมาข้าว่าให้คนเจ็บรู้สึกว่าอย่างไม่นายจากโรคเก่า มักจะสามวันต่อสั่นร้ายอยู่นานกว่าจะเห็นได้กันด้วยเจ้าทุเบอร์คุโลสิสมาเล่นงานแล้ว

* จากเอกสารสาธารณสุข อันดับ ๑๐ ฉบับพิเศษ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ - ๒๔, พระนิพนธ์ สมเด็จพระบรมราชชนก
อุดมเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทานแก่กรมสาธารณสุข เพื่อจัดพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเซชราธิราช
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานาถ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓.



ในที่นี้จะขอเล่าถึงอาการที่คนเป็นทุเบอร์คุกูลิสตมักจะมีไม่ มากก็น้อยไม่เร็วเกินนาน แต่บางคนก็มีอาการอย่างที่จะกล่าวต่อไปนี้ทุกอย่าง และถ้ามีอาการอย่างเดียว ก็ไม่จำเป็นจะเป็น ทุเบอร์คุกูลิสต แต่มีอาการอย่างเดียว อาจเป็นด้วยโรคอื่นหลวยอย่าง แต่ถ้าเป็นหลวยอย่างตามที่จะกล่าวต่อไปนี้รวมกันแล้ว หายได้ไม่ยากนิด

อาการต่างๆ ของคนเป็น ทุเบอร์คุกูลิสต มีดังนี้

๑. ไอ ขั้นดันคูเมื่อนเป็นหวัด แต่ไอน้อยๆ เรื่อยไป ที่แรกไหแห้งแคกรา แต่มีโครนหนักขึ้นก็มีน้ำมูกและเสมหะออกมาด้วย ที่นี้ทำให้อิดดงโคลกๆ ในขั้นดันมักจะรู้สึกเจ็บชาใจกลางเวลาไห บางคนเป็นมากก่อนจะหายที่ไอออกมากจะเหนียว และมีสีเขียวช้ำมีกลิ่นเหม็นแรง และโดยมากเมื่อใช้น้ำยาลอกมักจะมีโลหิตปนเสมหะออกมาด้วย ทำให้เสมหะเป็นสีน้ำตาล หรือแดงเป็นทางๆ เมื่อโครนหนักไหก็มากขึ้นทุกที เกาเข้ามากกว่าบ่าย จนเมื่อเจ็บหนักไม่มีกำลังอาการไวจึงคลาย

๒. อ่อนเพลีย คนหายเจ็บใหม่ๆ มักจะรู้สึกเพลีย ไม่มีแรง แต่ก็มักจะมีกำลังขึ้นเรื่อย แต่คนที่ดันดันเป็นทุเบอร์คุกูลิสต ต่อจากโครนแล้ว ก็เพลียเหมือนกันและเพลียมากขึ้นทุกที เข้าเป็นน้อย

๓. อม ตอนดันคนไข้ยังไม่รู้สึกว่าผอมลงมาก เ�ราะคนที่เป็นโครนนี้มักจะเป็นคนที่ผอมอยู่แล้ว แต่มีอาการไว้แล้ว คงไข้ ไข้ร้อนมากลงเรื่วามาก เห็นหันตา แต่ตอนปลายมักจะทรง

๔. ผิว ผิวนั้นมักจะซีดลง และซักมีสีเหลืองและใสบางเหมือนขี้ผึ้งสีปากสีน้ำเงิน เกาค้าหือเวลาดูบานาน มักจะมีแฝมแดงเป็นดวงคล้ายกับปูนแต้ม ผิดกับคนมีโลหิตติดตามธรรมชาติ ดวงนั้นดามักจะมัวในเวลาเข้า แต่ไห แจ่มเวลาลงคืนตอนหัวค่า ตาราวมมีสีคล้ายฟ้าฟ้า

๕. ไข้ อาการไข้มักจะมีตั้งแต่ต้นเจ็บ แต่โดยมากตัวร้อนน้อยเหลือเกิน จนไม่มีเครื่องสังเกต ตัวร้อนมักจะมาเวลาค้า แต่ไม่นำพอที่คนไข้จะเดือดร้อนเหมือนจับไข้มักจะกลับสบายขึ้นเสียอีก แต่เวลาเข้าตัวมักเย็นกว่าธรรมชาติ และเป็นเวลาที่คนไข้รู้สึกมีนุ และเพลียมาก นอกจากระดูค้า คนไข้อาจมีอาการตัวร้อนได้ง่าย ถ้าทำการหนักเกินไป หรือตกใจ หรือดีใจมากเกินไปมิดกับคนธรรมชาติมาก ตัวมักจะไม่ร้อนเหมือนคนที่เป็นไข้อื่นๆ ปroxที่ขึ้นอยู่ในรา

๑๐๑ องศา Fahrineit เป็นอย่างสูง

๖. หัวใจ และหัวใจร้อนมักเต้นแรงในเวลาที่มีไข้และถึงเวลาที่ไม่มีไข้ หัวใจและหัวใจร้อนมักจะเต้นแรงและเร็ว กว่าธรรมชาติ

๗. เหื่อออก ในเวลากอนกลางคืน มักจะมีไข้ในตอนหัวค่า ปกติมีอาการคล้ายสางไข้ และมีเหื่อออกมากจนต้องผ้าเปียกทำให้นอนไม่หลับ พอดีนเข้าตัวก็เย็นและทำให้สะท้าน

๘. โลหิต โลหิตออก เพราะเรื้อรังโครกินถึงหลอดโลหิต ทำให้หลอดร้าว อาการโลหิตออก มักจะมีเมื่อคนไข้ต้องออกกำลังมากเกินไป เช่น วิ่งหนีป่า หรือยกของหนักแล้วเห็นน้ำย่อย涌出 อาการโลหิตออกอาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๓ อย่างนี้

ก. เมื่ออาการหนักมากขึ้น ส่วนโลหิตในเสมหะที่ไอออกมากก็มีมากขึ้นจนลงท้ายมีโลหิตออกสดๆ ไอเวลาเข้า มักจะมีโลหิตมากกว่าเวลาบ่าย

ข. บางคนไม่มีโลหิตออกในเวลาไห แต่กระอักออกมากเป็นลิ่มๆ ในเวลาเข้า หรือบางที่เป็นน้ำออกประมาณถ้วงตะไส้ โลหิตใส่อาการหนักกว่าโลหิตเป็นลิ่มๆ

ค. โลหิตอาจออกมากทางปากเป็นอาเจียนโลหิตเมื่อเป็นเช่นนี้มักจะไม่รอดไปเก็บวัน เมื่อคนไข้คันได้มีอาการดังกล่าวมาแล้วนี้ทั้ง ๓ ประการ ควรที่ได้อ่านหนังสือฉบับนี้ก็อาจหายได้ ว่าคนนั้นเป็นโรคทุเบอร์คุกูลิสต แต่บางไข้ก็เป็นแต่บางอย่างเท่านั้น จนแพทย์เองก็สังเกตไม่ได้ต้องตรวจปอดและฟังลมหายใจ

แล้วเริ่มควรจะโครกุกูลิสตอย่างแน่นที่สุด คือวิธีตรวจหาเชื้อโครก ถ้าผู้ใดเป็นโครกุกูลิสตในปอดผู้นั้นมักจะมีเชื้อโครติดในเสมหะที่ขากอกมา แต่เชื้อโครกเด็กเหลือที่จะเห็นด้วยตาเปล่า เพราะจะน้ำ คนธรรมชาติจึงตรวจไม่ได้ แต่ถ้าคนพยาบาลคนไข้สังสัยโครก ทุเบอร์คุกูลิสต ก็ควรเก็บเสมหะใส่ไว้ในขวดเล็กที่สะอาด แล้วปิดฝาให้มิดชิด และส่งไปให้โรงพยาบาลตรวจ เจ้าพนักงานที่นั้นจะลงทะเบียนเฝ่นหงบนแผ่นกระดาษที่ทราบค่าหินหนึ่ง

จะทำให้เห็นเชื้อโรคได้ชัดขึ้นแล้วสองกล้องคู่จะรู้ได้ว่ามีเชื้อทุเบอร์คุโลสิสหรือไม่ ถ้าไม่มี ก็ควรส่งสเมหะมาให้ตัวจริงอีกสัก ๓ หนน เว้นระยะห่างกันสักครั้งละ ๑๐ วัน เพื่อให้แน่ใจ

เมื่อคันนาเรือ ทุเบอร์คุโลสิส ได้แม่แต่ตัวเดียวเรา ก็จะรู้ได้ว่า พากปัจจามิตตร์ย่องเข้าค่ายได้แล้ว และคงยังมีพากพ้องอยู่ในตัวเรืออีกมาก เรา ก็ต้องดังด้วยเรื่องขับได้ มันไปเสียให้หมด มีจะนั่นค่ายก็คงแทรกเป็นแน่

วิธีนำบัด

ปัญหาสำคัญที่คนไข้ทุกคนยอมจะถามก็คือว่าจะมีรักษาโรคนี้ให้หายได้หรือไม่ คำตอบว่า “รักษาได้แต่ยากมาก” เพราะเราต้องพยายามทำลายเชื้อโรคซึ่งอยู่ในตัวคนไข้ หรือย่างน้อยก็ต้องนำรุ่งร่างกายคนไข้ให้มีกำลังต่อสู้กับทานพิษ ซึ่งเชื้อโรคได้ทำขึ้นและป้องกันไม่ให้พิษนี้แพร่หล่ายเข้าไปในโลหิต ทำให้เป็นอันตรายแก่ส่วนอื่นของร่างกายอีก เปรียบด้วยเพลิงดวงน้อยดับด้วยลมปากได้ แต่ไฟในมีบ้านดับยากขันได้ ก็ได้กับโรคติดต่อโรคนี้ฉันนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเชื้อโรคได้ตั้งแต่เริ่มเป็นก็จะทำให้การป้องกันง่ายขึ้น เพราะเชื้อโรคหวานพื้นฐานที่พันธุ์เริ่ว ไม่สำคัญตั้งสักนิด เพราะฉะนั้นเราต้องตีพิษหน้าให้แทรกเสียก่อน กองทัพหลวงจะได้ตั้งค่ายไม่ติด

เมื่อท่านผู้ใดรู้สึกมีอาการตังที่ได้ก่อความไม่สงบ ถ้ามีแพทย์อยู่ใกล้ก็ควรไปให้เข้าตรวจดีๆ ถึงแพทย์จะอยู่ห่างก็ควรจะหาเวลาไปให้เข้าตรวจให้ได้ เพราะถ้าทึ้งไว้นานก็จะทำให้โรคกำเริบและแก้ยาก

ถึงเข้าจะว่าท่านไม่เป็นอะไร ก็ยังควรดูเสียก่อนว่าท่านไม่เป็นโรคร้ายที่สุดขั้นหนึ่ง ถึงจะเสียเงินค่าแพทย์ก็ไม่ควรเสียดาย เพราะถ้าท่านตระหนึ่นค่าตรวจแล้วเมื่อเป็นโรคมากจะต้องเสียเงินค่ารักษามาก ถ้าท่านตระหนึ่นค่ารักษา ท่านด้วยไปเงินก็เอาไปโลกหน้าด้วยไม่ได้และลูกหลานท่านจะเสียดายตัวท่านมากกว่าเงิน ถ้าเข้าไม่เสียดายท่าน เขายังรักเงินของท่านมากกว่าตัวท่านเมื่อท่านรู้เข้าจะยินดีหรือ?

ถ้าเมื่อท่านไปหานหมอยแล้ว เขายังไม่ยา กินท่านอย่าเพ้อเสียใจ เขายังจะให้คำแนะนำให้ท่านรักษาตัว ถ้าท่านทำตามคำแนะนำท่านก็จะเป็นผลดีเป็นแน่

ที่จริง ยาแก้โรคทุเบอร์คุโลสิสโดยตรงและโดยจะเพาะนั้น ยังทำขึ้นไม่ได้ มีแต่ยาแก้อ้อ แก้ตัวร้อนและอาการต่างๆ ของโรคนี้ แต่ทุกนานาไม่มีทุธ์ดีพอที่จะแก้โรคเองได้ ยาอาจทำให้ท่านรู้สึกสบายไปชั่วคราวเท่านั้น แต่โรคก็ไม่หาย มีวิวัฒนาอยู่อย่างเดียวที่จะระงับไม่ให้โรคนี้ลดไปอีกได้ ยานี้อยู่ในโลหิตของท่านเอง คนทุกคนมีเชื้อยาอยู่ในโลหิตซึ่งอาจต่อสู้กับเชื้อโรคได้บางคนก็มาก บางคนก็มีน้อย เพราะฉะนั้นบางคนคงติดโรคได้ง่าย บางคนถึงพยาบาลใช้อยู่ก็ไม่ติด

เชื้อยานในโลหิตนั้นบางเวลาไม่มาก บางเวลาไม่น้อยเมื่อเราตราชตัวร่างกายเกินประมาณ ในเวลาทำการหรือเวลาเล่นกีฬา เช่น อดนอนหรือออกอาหาร หรือทนนานวันร้อนมากเกินไป ร่างกายก็อ่อนเพลียกำลังด้อยเชื้อยากันไปโดยติดต่อ ก็น้อยลงในโอกาสอย่างนี้และตัวเชื้อโรคต่างๆ มากจะได้ทำ ห่วงพื้นอุழกามายทำให้เกิดโรคขึ้น แต่เมื่อเรารู้สึกกำลังด้อย และรู้สึกว่าเกิดโรคแล้ว เรายังต้องพยายามบำรุงกำลัง เชือกันโรคในโลหิตจะได้มีมากขึ้น

หน่วยเวศคนใดจะทำให้เชือกันโรคในโลหิตมีมากขึ้นได้เล่า?

ท่านไม่ต้องไปมองหาผู้วิเศษนี้ในที่ห่างไกลเลย ถ้าท่านมีภารกิจทางบ้านจะเดินหน้าท่านผู้วิเศษก็คือหน้าท่านเอง

ท่านผู้เขียนเป็นโรคทุเบอร์คุโลสิส จะเป็นผู้ช่วยแพทย์รักษาโรคท่านได้อย่างดี

(๑) ท่านควรเรือถือแพทย์ พยายามทำตามคำสั่งของแพทย์ให้ถูกต้อง มีจะนั่นท่านจะจ้างแพทย์มาเพื่อประโยชน์อะไร?

(๒) ขอให้ท่านเรือเดิน ว่ายาที่จะกินแก้โรคนี้โดยจะเพาะยังไม่ได้ เพราะถ้ามีแล้วคงจะไม่มีใครปิดบังให้ท่านรู้ เพราะฉะนั้นท่านอย่ากินยาจากกลางบ้านหรือยาฝีอก ยาเหล่านี้ถึงกินจะไม่เป็นอันตรายก็ไม่มีคุณและข้าต้องเสียค่าเปิดปากหลังยาลงๆ ด้วย ยาที่ที่สุดสำหรับกำจัดโรคนี้ก็คือ วิธีอยู่กินของท่านเอง



(๓) เมื่อท่านทราบว่าตัวท่านเจ็บแล้ว ก็ควรจะละทิ้งที่แสงแก้ไข เป็นการกินอยู่ให้ถูกลักษณะของคนที่รักษาด้วย อาจจะเปลี่ยนทุกอย่างย้อมเป็นการยากมาก แต่ถ้าทำได้มากเท่าใด ซองที่จะรักษาชีวิตให้รอดได้ก็มากขึ้นเท่านั้น

การนอน ควรเข้านอนแต่หัวค่ำ เพราะนอนหัวค่ำได้กำลังมาก ควรตื่นเช้า เพาะแผลเดี้ยวกันแก้โรค ควรนอนให้หลับไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมงจะจะพอ และกลางวันก็ควรนอนเล่นนิ่งๆ บ้าง ถึงจะไม่หลับก็ได้พักร่างกาย ถ้าท่านมีไข้แล้วควรนอนอยู่เสมอ อย่าลุกไปเดินมากนัก เมื่อท่านหายไปให้ใหม่ๆ ก็อย่าหักกำลัง ค่อยคลุกนั่งหรือเดินแต่ทีละน้อย เมื่อมีไข้มาอีก ท่านก็รีบลงนอนอีกจนหายได้

ในเวลากลางวันเวลาที่นอนมาบู๊ที่อกชาน นอนหากาหากาศก็ได้มี่อนกัน แต่ต้องระวังอย่านอนที่มีฝุ่นมาก เพราะจะทำให้ท่านไอ

ห้องที่อยู่ ถ้าท่านเลือกห้องอยู่ได้ ท่านควรเลือกห้องที่สะอาดที่สุดในบ้าน มีประตูหน้าต่างมากจะได้ไปรับห้องสูงจากดินตึกว่าเพราะไม่เข้า หน้าต่างประดูควรเปิดไว้เสมอ ถ้ากลัวหนาวก็หาผ้าคลุม ถ้ากลัวฝนก็ใช้กันสาดบังหน้าต่างได้ หรือปิดเต็มทางที่สำคัญ ถ้ากลัวจะไม่ยกทำถูกกรงใส่เสีย ถ้าไม่มีเงินทำถูกกรงก็อย่าเก็บของที่มีราคาไว้ในห้องนั้นจะไม่ยกไปเมืองนอก

พื้นห้องอย่าปูพรมหรือเต้อ แต่รักษาพื้นกระดานให้สะอาด และใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดบอยๆ อย่าให้มีละอองจับได้

อย่าแขวนอะไรรุ้งจากเพดานหรือฝ้าผนัง เพราะทุกสิ่งที่มีอยู่ในห้องจะทำให้ละอองมากขึ้น และละอองเป็นของแสงแก้โรคมาก

ระวังอย่าทิ้งอาหารไว้ในห้องนอน Müdและแมลงวันจะเข้าและคอม ถ้าไม่มีไข้แล้วกินอาหารออกห้องนอนดีกว่า

คนใช้ควรจะให้นอนบนเตียง และอย่าเอาอะไรต่อตัวๆ ชุกได้ไม่ได้เตียงเพราะจะทำให้อาการเดิมรีสระดาก ระวังอย่าให้ที่นอนเหม็นสาบ คอยผึ้งแผลผึ้งลมบอยๆ

อาหาร อาหารกับการนอนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะบำรุงกำลังให้ร่างกายต่อสู้เรือโรคได้ เพราะจะนั่นคนไข้ควรกินแต่อาหารที่จะบำรุงกำลัง

ควรกินสิ่งที่เป็นมันมากๆ อย่างมะพร้าวและมันและเนื้อสัตว์ต่างๆ อาหารที่เป็นแป้งและข้าว ก็ได้มี่อนกันผักดิบ ผักดัน และข้าวมันต่างๆ ที่มีน้ำตาล และมะพร้าวมาก เช่น ฟักข้าว เบินดัน เป็นของโภชนาณนี่ใจ และชูกำลัง ผลไม้สุก กินได้ แต่ผลไม้ดิบ เช่น มะม่วง จ้มน้ำปลาไม่ดี ควรกินอาหารหวานมัน หวานอาหารที่เผ็ดเค็ม เช่น น้ำพริกหรือแกงเผ็ด ไม่ควรกิน อาหารที่ต้องหมักหรือดองเปรี้ยวเค็ม อาจทำให้ห้องเสียและไม่สู้จะให้กำลังแก่ร่างกายมากนัก

ส่วนเครื่องดื่มควรกินน้ำสุก กินน้ำมากไม่มีอันตรายกับตัวทำให้ร่างกายสบายเสียอีก แต่ควรเว้นดูว่าทุกๆ ชั่วโมงถ้าหาน้ำมันสดที่สะอาดได้ จะเป็นน้ำนมโคหรือน้ำนมแพะก็ตาม ถุงเตียบพอกใบเข้า แล้วดื่มน้ำกำลังอุ่นๆ เป็นของดีนัก

การกิน ต้องหาน้ำดื่มและปูรุงให้มีรสที่จะทำให้คนไข้รู้สึกอร่อย จะได้กินได้มาก ถึงจะมีของแสงลักษณะน้อย เพื่อส่ออาหารก็ไม่เป็นอะไร แต่ต้องระวังอย่าให้กินมากจนทำให้ห้องเสีย และควรกินเป็นเวลาทุกวัน เวลา กัดกลางคืนควรให้กินน้อยกว่าเวลากลางวัน จะกินบ่อยเท่าไรก็ได้ แต่ต้องระวังอย่าให้อาหารประจำคัดเวลา เป็นต้น ว่าระหว่าง เช้าเข้ากับเช้ากลางวัน จะกินไก่ต้มหรือเข้าก็ได้ แล้วตอนตึกควรกินไก่หนึ่งฟองหรือน้ำนมหนึ่งถ้วย

ในเมืองไทยเราอาหารมักจะมีเป็นถุง เช่น ผลไม้ต่างๆ เป็นต้น เพราะจะนั่นคนไข้ก็ควรถือถูกเป็นโอกาสที่จะยกย้ายวิธีกินอาหาร เช่นในถุงหน้า ควรกินอาหารที่มีน้ำมาก เช่น หมูหวานและข้าวที่มีมะพร้าวมาก จะรู้สึกมีรสอร่อย ไม่เลี่ยนเหมือนกินในถุงร้อน และห้องก็จะไม่เสียด้วย แต่ในถุงร้อน ท่านก็ควรกินอาหารที่ลวกๆ เช่น แป้ง ไข่และปลา ควรต้มน้ำมากๆ กินผลไม้ พอกประมาณ คนโดยมากกินผลไม้ชั่วโมงหนึ่งมากเกินไป เพราะเกรงว่า จะหมดถุงเดียว ถ้าท่านระวังตัวให้มีชีวิตอยู่อีกปีหนึ่ง ตันไม่นั้นก็คงจะมีผลอีก



อาหารที่เป็นยา ในหมวดอาหารทั้งหลาย ในที่นี้จะกล่าวถึงอาหารที่เป็นยาด้วย คือ น้ำมันปลา น้ำมันตับปลา คือ มีขยันหลายชนิด เป็นยาช่วยบำรุงกำลังทั่วไปกินครั้งละข้อนหวานเมื่อกินอาหารแล้วสามารถ เด็ก แต่ผู้ใหญ่ก็ได้ผลเหมือนกัน แต่ควรกินเวลาหน้า เพราะเวลา空腹 นักทำให้ห้องเสีย

เครื่องแต่งกาย คนเจ็บเป็นโรคทุเบอร์คุณลิสควรระวังด้วยแต่งกายให้ถูกแก่อากาศ ในชั้นต้นควรจะสวมเสื้อ เสื้อ แต่ถ้าอากาศร้อนก็สวมแต่เสื้อบาง เพราะเสื้อเป็นของที่กันไม่ให้เราหนา และเมื่อเราห้อนเสื้อนั้นก็ขับเหื่อ ออกจากตัวเราด้วย เมื่อหันเข้าและยกจะหายหานก็ต้องใช้ความสังเกตให้มาก ถึงเวลาอาการหน้าก็อย่าทัน หน้าอยู่ หาผ้ามาคลุมด้วยเสื้อ ถึงเวลาเริ่มนก็อดต้องหันอกหรือเลิกผ้าคลุมออก อย่าให้หันร้อนหรือหันหนาว เพราะ ขี้เกี้ยบเปลี่ยนเสื้อ เรายังไงเสียแต่ว่าโคงนทันหน้าไม่ได้เท่านั้น แต่ที่จริงร้อนมันก็ทันไม่ได้เหมือนกัน ความไม่สบาย อย่างใดอย่างหนึ่งของร่างกาย อาจเป็นอันตรายได้หันนั้น หันด้วยพยายามไม่ให้หันหันเปียกฝน และเมื่อเปียกแล้ว ก็ต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ก่อนที่หันจะรู้สึกหน้าขนคุดขึ้นพอง

การออกกำลังกาย เวลาหันมีไว้ต้องนอนอยู่ในที่นอนหรือลากเก้าอี้ยวานอนนิ่งๆ อยู่ที่นอนกานเพื่อกิน อากาศและดูคนเดริปมาตามปริบๆ อยู่เท่านั้นแต่ไม่ควรจะถูกขึ้นทำการเชือดเชือดไว้

แต่เมื่อเวลาที่ไม่มีไข้ หันควรจะถูกขึ้นทำการเบาๆ หรือเดิน หรือเล่นอะไรที่หันรอบ เช่น ทำสวนหรือ การเล่นต่างๆ ให้เพลินใจ แต่อย่าทำการหรือเล่นอะไรจนเหนื่อย ต้องอยู่ฝึกตัวไปทีละน้อย ถ้ามีไข้ก็ต้องกลับไปนอนเสียอีก

การอาบน้ำ เว้นเสียแต่เวลาเมื่อไข้ การอาบน้ำให้สะอาดเป็นการตีมากแต่ต้องระวังอย่าให้หน้าสะท้านได้ ควรอาบแต่เวลากลางวัน หรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวรักษาผิวให้สดใสอยู่เสมอ อย่างว่ายน้ำเล่น เพราะจะทำให้เหนื่อยมาก และเมื่ออาบน้ำแล้วต้องเช็ดตัวและผอมให้แห้ง

ความประพฤติเบ็ดเตล็ด

การสูบบุหรี่หรือกัดลงยาจะนิดๆ ไม่ได้เป็นอันขาด แต่เด็กๆ ที่ไม่มีโรคไข้夷ังว่าด้วยจะด่า การสูบบุหรี่ ทำให้ผงบุหรี่และควันที่ขัดเข้าไปจับในผิวปอด เวลาผ่าศพคนตายออกตู้ อาจแลเห็นผนังนี้เข้าไปจับเป็นดวงๆ อยู่ในปอด ในปอดโคงและกระเบื้องเมมี่ เพราะสัตว์เหล่านี้ไม่สูบบุหรี่ ผงและควันอาจทำให้ผิวปอดอักเสบ และบุหรี่มียาพิษ ทำให้เม้าได้เป็นเหตุอันหนึ่ง ซึ่งทำให้เสื่อสำหรับป้องกันโกรในโลหิตน้อยลง

การเคี้ยวหมากหรือเมี่ยงไม่มีอันตราย แต่หากเมื่อเคี้ยวมากมักจะทำให้เบื่ออาหาร และรักษาปากให้สะอาดยาก จึงระวังอย่าบ้วนน้ำหน้าเหลือเทอะไป เพราะถึงน้ำหน้ามากก็อาจมีเชื้อโรคติดอยู่ได้ เวลาจะคายขันมาก หรือเมี่ยง ควรคายในที่ๆ แมลงวันจะมาต่อไม่ได้ คายลงในเตาไฟฟ้าเป็นตื้จังให้เดียวให้มีไฟเสียที่เดียว เชื้อโรคจะได้ไม่กระจายและปลิไปที่อื่นได้ หากที่ไปร่วงด้วยไปร่วงใจอย่างยอดเยานหรือกลางทุ่ง บางคนก็ชอบเปลี่ยนจากที่หน้าไปที่ร้อน บางคนก็กลับตรงกันข้าม

แต่ที่มีคนแนะนำ เช่น ในกลางเมืองใหญ่ ที่มีผู้มากไม่ตีเป็นแน่ ที่ขายทะเลไม่ตีเหมือนที่สูงแห้ง แต่ก็ตีกว่าที่ดับ เช่น ในเมือง

การเลือกที่อยู่ที่จะให้ถูกแก่ความต้องการทุกอย่างเห็นจะมากมาก แต่อย่างไรก็ต้องที่ จะหาอาหารได้บริบูรณ์ เพราะการบำรุงอาหารสำคัญกว่าสถานที่อยู่

การเปลี่ยนที่นักจากที่จะได้ผลแก่ว่างกาย อาจทำให้ใจของคนไข้สบาย เพราะได้ร้ายจากที่เก่าไปอยู่ที่ใหม่

อาการหาย

โคงนี้จะนับว่าหายขาดไม่ได้ แต่ถ้ารักษาตัวดีก็อาจประทั้งชีวิตไปได้นาน และบางทีก็พ้นได้คล้ายกับคนปกติ

อาการพื้นก็คือไม่มีไอ ไม่จับไซ และไม่มีโลหิตออก ผิวนังก็ดูแย่ขึ้น และบางคนก็มีเนื้องน้ำขึ้นมาก

วิธีที่จะตรวจให้แน่ว่าหายหรือไม่ ก็ต้องส่งสมนระไปให้แพทย์ตรวจหาเชื้อโรค ถ้าหากไม่พบ ๓ หน เว้นเวลาตรวจที่หนึ่ง ๑๐ วัน จึงนับว่าผู้นั้นวันจากโรคได้

บางที่เมื่อประทั้งโรคไว้ได้อย่างนี้ ทำให้คนไข้มีความรู้สึกสบายเหมือนคนปกติ เลยทำให้ผู้นั้นอยากกระทำกิจการและการเล่นต่างๆ เมื่อนอนก่อนเข้านอน เป็นหลุมที่คนไข้ตกลมาเสียหายนายคน เพราะโรคนี้อาจกลับมาอีกโดยฉับพลัน และร้ายกว่าเก่า เพราะฉะนั้นคนไข้ควรจะระวังตัวให้มาก

ถ้าท่านรักษาตัวเอง ต้องพยายามประพฤติตามอย่างที่จะกล่าวต่อไปนี้ เมื่อท่านหายจากโรคแล้ว

(๑) พยายามอยู่กินเหมือนอย่างเมื่อเจ็บ คือนอนหัวค่า กินอาหารที่เป็นคุณ และเว้นของที่แสงแก่โรค

(๒) พยายามรักษาความสะอาดในบ้าน เปิดห้องให้ป่องได้แสงสว่างและลม

(๓) เว้นเพศสุขบุหรี่และยาเม็ดต่างๆ

(๔) ท่านต้องเรียนรู้กำลังของท่าน ว่าควรทำงานหรือการเล่นเพียงไร เมื่อรู้สึกเหนื่อยเมื่อใด ควรหยุดเสียทั้งการเล่นและธุระ ค่อยทำงานขึ้นทีละเล็กน้อยจนร่างกายค่อยชินไปกับงาน แต่อย่าหักโหมจนรู้สึกเหนื่อย

(๕) อย่าไปในที่ๆ มีคนแน่น เพราะท่านคงจะทนอากาศอบไม่ได้ และไม่มีกำลังที่จะเบียดเข้าเหมือนคนที่ไม่เจ็บ เพราะฉะนั้นอย่าไปโรงหนังบ่อยนัก ดูในละครก็ควรระวังอย่าให้เข้าเบียด

(๖) จะหลีกที่ๆ มีฝุ่นมาก เพราะฝุ่นจะทำให้คันคอ การไอจะกลับมาอีก

(๗) ควรรู้จักสังกัดของการศึกษาและรักษา และพยายามห่มผ้าหรืออุ่นดื่มน้ำให้เหมาะสมแก่อากาศ อย่าได้ปล่อยให้หนาหานลูกนพงหรือร้อนจนหน้ามืด ระวังอย่าให้เปียกฝน เมื่อเปียกแล้วก็ให้รีบเปลี่ยนเสื้อผ้า

(๘) ถ้าได้ไปเปลี่ยนอากาศหายกลับมาแล้ว ครั้นมาถึงบ้านกลับเป็นใหม่ก็ควรย้ายสถานที่อยู่เสีย และเปลี่ยนที่ทำงานหากได้ทางที่จะไม่แสงแก่โรค

(๙) ถึงหายเจ็บแล้วน้ำใจก็เป็นของสำคัญเสมอถ้าทำใจดีไม่ย่อท้อ และอย่าประมาทว่าเรามาหายแล้วไม่กลับเป็นอีก แต่ก็อย่าเป็นห่วงว่าโรคจะกลับ อย่าเก็บสิ่งที่ร้อนใจมาเป็นทุกข์ ระวังอย่าให้มีความกลุ่มใจ เพราะร้อนใจก็อาจร้อนถึงกายได้

(๑๐) ท่านก็ได้มีความชำนาญรักษาตัวแล้ว ก็ควรหมั่นช่วยสอนนิริรักษาระวังให้แก่เพื่อนบ้าน พากเราจะได้ไม่เป็นโรคนี้ และเมื่อเป็นก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อยารักษา เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่ายา ก็ช่วยอะไรไม่ได้

เมื่อรู้สึกว่าอาการของโรคเก่ากลับมาอีกเมื่อใด ท่านอย่าได้ประมาท รีบไปหาแพทย์ให้ตรวจ และกลับประพฤติตัวให้ถูกต้อง โรคจะได้ประทั้งไปได้อีก

ถ้าญาติพี่น้องหรือคนในบ้านเจ็บเป็นโรคทุเบอร์คุโลสิส ท่านควรจะทำอย่างไร?

(๑) การตรวจคนที่เป็นโรคนี้มักไม่ชอบให้คนรู้ว่าเป็น และมักจะไม่ยอมให้แพทย์ตรวจ เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดในบ้านมีอาการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ควรพยายามเกลี้ยกล่อมให้เข้าไปพบแพทย์ตรวจเสียให้รู้แล้ว และส่งสมนะไปตรวจด้วย

(๒) เมื่อทราบแล้วว่าเขเป็นโรคนี้แล้ว ควรระวังเอาใจเข้าให้มาก เพราะท่านก็ทราบว่าโรคนี้ให้ทุกข์อย่างไร ต้องทำให้เข้าใจขึ้นໄกว่สมอ นี่ก็เป็นยาอย่างหนึ่งเหมือนกัน

(๓) ขอให้ท่านจงช่วยเขาให้ได้รับการรักษาพยาบาลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะถ้าไม่รักษาป่วยทิ้งไว้โรคก็จะหนักขึ้น และคงจะต้องป่วยท่านวันหนึ่ง การรักษาพยาบาลก็ไม่แพงอะไรนัก เพราะฉะนั้นควรช่วยเหลือมนุษย์ที่ลำบาก ถูกหลอกันนี้ก็จะเป็นของท่าน

(๔) ผู้ที่อยู่กับคนเป็นโรคทุเบอร์คุโลสิส ควรรู้สึกว่าตนมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้โรคนี้ติดตันหรือคนอื่นได้ต่อไป เพราะฉะนั้นท่านควรดูแล และสนใจอ่านคำแนะนำการป้องกันให้มาก

(๕) ตัวผู้พยาบาลเองก็ควรรักษาความสะอาด คือล้างมือบ่อยๆ และทำตัวให้สะอาดอยู่เสมอ อย่าใช้ของรวมกับคนไป และบำรุงร่างกายของตนให้สบายนะ เพราะโรคนี้มักติดต่อคนที่มีกำลังทรุดโทรม



วิธีกำจัด

ท่านเห็นแล้วว่าโรคนี้ร้ายอย่างไร เมื่อเจ็บลงก็รักษายาก ตายเสียกว่าครึ่ง และท่านทราบว่าในเมืองไทยเป็นกันมาก ท่านก็ควรช่วยป้องกันให้แข็งแรง ตามที่ได้ทำการตรวจสอบค้นหาโรคที่ทำให้คนตายในโรงพยาบาลศิริราชที่กรุงเทพฯ ทุก ๑๐ คนที่ตรวจได้พบรอยเป็นโรคทุเบอร์คุโลสิส ๒ คน ใน ๒ คนที่มีรอย ศพหนึ่งสันนิษฐานได้ว่าตายด้วยโรคทุเบอร์คุโลสิส แปลว่าจำนวนที่พบรอย ๑๐ คน ต้องตายด้วยโรคนี้คนหนึ่ง ที่เมริกาก็เคยมีโรคอย่างนี้มากกว่าที่นี่ แต่ใน ๕๐ ปีที่แล้วมา เข้าได้ทำการกำจัดอย่างแข็งแรง โรคทุเบอร์คุโลสิสก็ลดลงทุกที่ เพราะฉะนั้น เมืองเราจะไม่ทำการป้องกันและกำจัดบ้านหรือ

การกำจัดโรคทุเบอร์คุโลสิสเป็นการใหญ่และเสียเงินมาก และกินเวลานาน เพราะเกี่ยวด้วยการสรงเคราะห์คนอนามาเสียโดยมาก แต่มีบางอย่างที่ทำได้โดยไม่ต้องเสียเงินเลย ถ้าราชภรัฐมีน้ำใจช่วยกันทุกคน วิธีที่ราชภรัฐจะช่วยได้มีดังนี้

ในขั้นต้นเราต้องไม่ให้โรคนี้แพร่หล่ายไปจากคนไข้ถึงคนได้ แล้วต้องบำรุงร่างกายคนไข้ให้แข็งแรงบริบูรณ์เพื่อในเมือเชื้อโรคเลือดออกเข้ามาจะได้มีกำลังต่อสู้ทนทานเชื้อโรคได้

การป้องกันไม่ให้โรคแพร่หล่ายต่อไปมีดังกล่าวต่อไปนี้

(๑) เราต้องช่วยทำบัญชีว่ามีคนเป็นโรคนี้กี่คน แพทย์ตรวจโรคควรช่วยจดบัญชีไว้ว่าได้พบใครเป็นโรคทุเบอร์คุโลสิสบ้าง และพอดีเดือนกันยายนรายงานส่งไปให้เจ้าหน้าที่ ถ้าผู้ใดทราบว่าคนหรือญาติเป็นก็ควรบอกเสีย เพราะจะปิดได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร กลับจะให้ร้ายแก่คุณ

(๒) เราต้องช่วยคนไข้ให้ได้โอกาสรักษาตัวจริงจังคือ หาแพทย์ที่ดี และกันอย่าให้พากแพทย์เศกเป่าหรือให้ยาวิเศษมารักษาได้ เพราะเราอู้ย์แล้วว่าโรคนี้จะรักษาด้วยยาอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากบำรุงให้คนไข้มีกำลังด้วยอาหารดี และอยู่กินถูกต้องตามกฎภัยบริหาร

(๓) การรักษาแต่คนไข้เท่านั้นยังไม่พอ ต้องกันไม่ให้โรคไปตัวคนตัวคน ด้วย กันไว้ก่อนแก้ เรายาจัดทำการป้องกันได้ดังนี้

เราทราบแล้วว่าโรคนี้ติดได้แต่เมือเชื้อโรคออกจากตัวคนไข้ และเข้าไปในตัวของเรางานนั้น ไม่มีสาเหตุอื่นอีกเลยที่จะทำให้โรคนี้เกิดมาเองได้ เพราะฉะนั้น ถ้าทำลายพืชพันธุ์เสียได้ โรคนี้ก็จะศูนย์ไปจากพวงเรา

ตัวโรคเหล่านี้อยู่ที่ไหนเล่า?

ตัวโรคต้องอาศัยอยู่ในตัวมนุษย์ หรือสัตว์ที่มีชีวิตเสมอ มีชนน์จะขาดอาหารและท่ออยู่ เพราะฉะนั้นโรคนี้ติดได้แต่จากมนุษย์และสัตว์บางอย่างเท่านั้น

ติดกันได้อย่างไร?

คนที่เป็นโรคทุเบอร์คุโลสิส มักจะถ่ายเชื้อโรคออกพร้อมกับสิ่งชี้ของจากร่างกายต่างๆ คือ อุจจาระ ปัสสาวะ และน้ำมูก น้ำลาย และสิ่งเหล่านี้มักกลับมาเข้าปากมนุษย์อื่นในทางเดินหายใจ ทางน้ำ

อุจจาระและปัสสาวะ มักจะมีเชื้อโรคติดออกมากเมื่อมีโรคทุเบอร์คุโลสิสในลำไส้หรือในไต แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เมื่อไก่เส้าปาก เพราะถ่ายออกเป็นเวลาและทึ่งเป็นที่ ส่วนคนที่เป็นทุเบอร์คุโลสิสในปอดมักจะไอและต้องขาดเสนหะปอยๆ เพราะฉะนั้นทุกคนที่เจ็บเป็นโรคนี้ควรระวังอย่าบ้วนน้ำลายให้ประอะเป็นทัวไป บ้วนลงในกระทงที่มีฝาปิดมิดชิด และบ้วนให้เต็มแต่ครึ่งกระทง เวลาหายใจได้ไม่นัก แล้วทั้งลงในเตาไฟเผาใหม่เชื้อโรคจะได้ไม่ปลิวไปที่อื่นได้ เมื่อไม่ใช่กระทงใช้กระโจนใบเล็กๆ ก็ได้ แต่ต้องหมั่นเทและลากด้วยน้ำร้อนอย่าไปเทลงในที่ๆ คนจะเหยียบได้ เทลงหลุมกลบเสียเป็นดี

เวลาไอกามต้องระวังใช้ผ้าหรือมือบังปาก น้ำมูกน้ำลายจะได้ไม่กระเด็นไปถูกคนอื่นถ้ามีน้ำมูกออกเวลาจามควรส่งออกไว้กับผ้าแล้วด้มหรือเผ่าผ้านั้นเสีย อย่าส่งด้วยมือ เพราะเมื่อเปื่อนมือไปจับสิ่งอื่นก็จะเอาเชื้อโรคอันนั้นไปให้ไว และน้ำมูกก็จะตกอยู่ในมือ คนจะเหยียบได้



เลือผ้าที่คนใช้ใช่ทุกสิ่ง ปลอกหมอนและผ้าปูนอนถ้าได้ถูกต้องด้วยคนใช้หรือสิ่งที่ออกจากด้วยคนใช้ ควรลวกด้วยน้ำเดือดหรือผึ่งแเดคในเวลากลางเที่ยงให้ผ้าเหล่านั้นแห้ง เพื่อทำลายเชื้อโรคด้วยแสงอาทิตย์ แล้วจึงค่อยฟอกส่วนของที่ฟอกไม่ได้ควรผึ่งแเดคไว้นานๆ เชื้อโรคที่มีชีวิตอยู่ได้นอกด้วยคนใช้ ก็แต่ในเวลาที่สิงของที่เชื้อโรคติดอยู่ยังเปียก เช่น ผ้าเปียกเสมอเป็นต้น เสมะเป็นของที่แห้งช้า จึงอาจทำให้คนมาถูกต้องและติดเชื้อโรคไปได้ ถ้าหากเสียให้แห้งเชื้อโรคก็ตาย

เครื่องใช้และภาชนะต่างๆ ที่คนใช้ใช้ หรือเข้าไปในปากคนใช้อย่าให้คนดีใช้ช้า ควรลวน้ำร้อนหรือล้างให้สะอาดแล้วผึ่งแเดคสีຍก่อน

การกินอาหารเหลือหรือร่วมกับคนใช้ไม่ควรทำเพราจะจากปากคนหนึ่งอาจไปเข้าปากอีกคนหนึ่งได้ง่าย

เวลาคนใช้พูด หรือไอ جام ไม่ควรให้คนดีอยู่ใกล้เพราจะเวลาพูดก็อาจมีน้ำลายกระเด็นออกมากได้บ้าง ฝอยน้ำลายถึงจะเป็นหยดเล็กเท่าได้อาจมีเชื้อโรคติดอยู่ในฝอยน้ำลายตัว ซึ่งถ้าเข้าปากจะมูกคนอาจทำให้เกิดโรคได้ แต่ในเวลาที่คนใช้ขอยื่น ไม่มีอันตรายอันใด เพราะลมหายใจออกไม่มีน้ำพองที่จะเป็นหยด โรคมักจะติดอยู่กับน้ำมูกในจมูก เมื่อสั่งออกมากถึงออกเพราจะน้ำน้ำไม่ต้องกลัวว่าเชื้อโรคจะบินออกมาจากคนใช้มาจับคนดีได้เชื้อโรคนี้ไม่มีปีก ต้องอาศัยน้ำมูกน้ำลายเป็นเครื่องบินจึงจะเที่ยวไปในอากาศได้ การถูกด้วยคนใช้บ่อยๆ และนาน เช่นนอนด้วยหรือกอดจูบด้วยความรักใคร่ โรคอาจติดได้ เพราะฉะนั้นคนใช้ไม่ควรให้เด็กเล็กมาเล่นอยู่ด้วยเพราจะเด็กเล็กๆ เมื่อเห็นอะไรก็เก็บเข้าปากบางทีก็ชอบดูดนิ้วนิ้วคนใช้ หรือคนใช้จะจูบเด็กด้วยความกรุณาเข่นนี้อาจให้โรคแก่เด็กได้

อย่าเข้าในที่ประชุมใหญ่ที่มีคนแน่น เช่นในโรงหนังและโรงละครสำหรับคนใช้เมื่อถูกคนเบียดทำให้เสียกำลังสำหรับคนปกติ เมื่อไปเบียดกับคนที่เป็นโรคทุเบอร์คุโลสิส อาจติดเชื้อโรคนั้นกลับมาได้

ควรนี้จะกล่าวถึงการบำรุงร่างกายคนให้ทนโรคได้ คนจะนิด岱มกจะเป็นโรคได้ง่าย

มีคนสามชนิดที่จะติดโรคง่ายกว่าธรรมดា

(๑) เด็ก เด็กมีกำลังทนทานพิชชของเชื้อโรคต่างๆ ได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ และเด็กไม่ไคร่ระวัง จวยอะไรได้ก็เอ้าเข้าไปในปาก โรคก็เข้าตัวเด็กได้ง่าย เพราะฉะนั้นเราไม่ควรให้เด็กอยู่ปนกับคนที่เป็น ทุเบอร์คุโลสิส บางที่โรคติดเด็กนานแล้ว แต่เด็กไม่มีอาการจนได้ใช้กลับเป็นได้

(๒) เรามักจะได้ยินว่าโรคทุเบอร์คุโลสิสอยู่ในโลหิตของสกุลถ้าบิดามารดาเป็น บุตรหลานมักจะเป็นเช่นเดียวกับโรคเสียจริต หรือสืบสกุลกันอย่างลักษณะรูปร่างต่างๆ ความข้อนี้มีจริง โรคนี้ติดกันไม่ได้โดยเชื้อโรคออกจากคนหนึ่งไปเข้าอีกคนหนึ่ง แต่จริงอยู่ถ้าคนที่เป็นโรคทุเบอร์คุโลสิสสมิบุตร บุตรนั้นไม่ไคร่จะแข็งแรงเหมือนคนดีและถ้าอยู่ใกล้ชิดบิดามารดาโรคก็จะติดได้ง่าย บางที่เด็กจะมีกำลังด้านทนโรคนี้ได้จนโต แต่เมื่อโตขึ้นแล้วมีเหตุอันหนึ่งขึ้นได้ทำให้กำลังทรุดิหรมลง โรคที่ติดจากบิดามารดาตั้งแต่เด็กก็อาจกำเริบขึ้นได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นทุเบอร์คุโลสิก็ไม่ควรเลี้ยงลูกเองและบุตรของผู้นั้นก็ควรจะระวังด้วยให้มากกว่าคนธรรมดายังตัวได้รับผลกระทบความอ่อนแอมากจากบิดามารดาแล้ว

(๓) คนจะนิด岱มกจะติดโรคนี้ง่ายที่สุด อยู่ในจำพวกที่กำลังด้านทนเชื้อโรคอยู่ปัจจุบัน เเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจระวังไม่ให้กำลังถอยได้แล้ว คนทึ้งหลายก็จะติดและเป็นโรคทุเบอร์คุโลสิสสนอยลง

สาเหตุที่จะทำให้กำลังอ่อนลงได้ มีดังนี้

(๑) ความหนาวดหรือข้อนัด แสงแกมนูนช์เพราทำให้เป็นหวัดได้ และเมื่อเป็นหวัดแล้วอาจทำให้เชื้อโรคได้โอกาสเข้าไปทำอันตรายได้ และถ้ามีเชื้อโรคอยู่ในตัวแล้ว โรคก็จะ逕ไป เพราะฉะนั้นควรระวังอย่าให้เป็นหวัดได้ และเมื่อเป็นแล้วก็ควรรักษาด้วยบ้านถึงจะเป็นนิดหน่อย เพราจะไปในที่ประชุมชนอาจต้องไปนั่งใกล้คนเป็นโรคทุเบอร์คุโลสิสที่ไม่วุ้จกระวังไม่ให้เชื้อโรคกระเด็นออกจากการปากเวลาจะพูด

(๒) ผู้มีโรคอย่างอื่นอยู่แล้ว และผู้ที่หายไม่หมด ยังไม่ทันแข็งแรงดี เช่นผู้สร่างไข้หวัดใหญ่ใหม่ๆ เมื่อเชื้อโรคเข้าปากก็อาจทำให้พั้นธุ์ได้ง่าย เพราะกำลังด้านทนอ่อนลงเป็นโรคทุเบอร์คุโลสิสได้ ผู้ที่มีเชื้อโรคอยู่แล้วแต่ไม่มีอาการ เมื่อเจ็บลงด้วยโรคอื่น อาการโรคทุเบอร์คุโลสิสก็ผุดขึ้นมาได้ เพราฉะนั้นเวลาท่านเจ็บลงด้วยโรคใดก็ได้ควรระวังอย่าให้เปิดโอกาสให้เชื้อโรคทุเบอร์คุโลสิสมาพ้องพาได้



(๓) หอยมีคราภ์มักจะติดโรคง่ายกว่าคนปกติ เพราะฉะนั้นระวังอย่าให้เจ้านล่อนดองเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้เป็นโรคทุเบอร์คุโลสิต เมื่อผู้เป็นทุเบอร์คุโลสิตมีคราภ์มักจะกำเริบด้วย

(๔) การทำงานหรือเล่นกินประมาณ จนถึงต้องอดนอนอดอาหาร หรือถึงได้นอนและได้อาหารก็ไม่พอ และไม่เป็นเวลานั้น ย่อมทำให้ร่างกายทรุดโทรมและงานให้ติดโรคทุเบอร์คุโลสิตง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นมือท่านมีความจำเป็นต้องทำการเหนื่อยงานร่างกายทรุดโทรมท่านไม่ควรจะไปคลุกเคล้ากับผู้เป็นทุเบอร์คุโลสิต

(๕) ในจำนวนคนที่เสพย์สุราามาต่างๆ มากเป็นนิจ มักจะคันพบจำนวนคนเป็นโรคทุเบอร์คุโลสิต มากกว่าในจำนวนคนที่ไม่เสพย์สุราามา เพราะสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขและกำลังช้ำแล่นเท่านั้น เมื่อนយมิงของคนอื่นมาจ่ายตลาด เมื่อกลับมา ก็ต้องใช้หนี้และดอกเบี้ยอีกด้วยซ้ำ เมื่อคนสร้างมาแล้ว ก็มักจะกลับรู้สึกเพลียไปมากกว่าไม่ได้เสพย์เสียเลยจนกว่าจะได้เสพย์ของมาซ้ำอีก เพราะฉะนั้นเชื่อโรคจึงมีโอกาสทำร้ายมาก

เชื่อโรคทุเบอร์คุโลสิตนี้เข้าทางหลอดลม และเป็นในปอดโดยมาก เพราะฉะนั้น การสูบบุหรี่ ถึงจะเป็นยาามาอย่างอ่อนและมีอันตรายน้อย ถ้าอัดคัณมากก็อาจทำให้ผิวในของปอดและหลอดลมอักเสบได้ เมื่อที่ไหนในร่างกายอักเสบแล้ว เชื่อโรคก็ได้ช่องทางตั้งต้นที่พื้นที่อักเสบนั้น

(๖) เราเคยได้ยินว่า ทุบออก หรือหลังจะทำให้เป็นฝีในท้อง ท่านทราบแล้วว่าทุบออกเท่านั้นจะทำให้เป็นทุเบอร์คุโลสิตไม่ได้ เพราะโกรคนี้จำเป็นต้องมีเชื้อเข้าไปจึงจะเกิดขึ้นได้ แต่การทุบออกอาจทำให้กระเทือนไปถึงอวัยวะสำคัญ กล่าวคือ ปอด กำลังต้านทานเชื่อโรคก็อาจเสื่อมไปได้ การทุบออกของคนเองก็มักจะมีแต่ผู้เสียใจมากทำเป็นการไม่ดีทั้งการทุบออกและการเสียใจ เพราะคนที่ใจเสีย แล้วกายก็พอดายตายไปด้วย เพราะเหตุนี้การรื้นเริงไม่มีกังวล จึงเป็นการป้องกันโรคอย่างดีอันหนึ่ง



โรคทุเบอร์คุโลสิสในอวัยวะอื่น

โรคทุเบอร์คุโลสิสที่เป็นแก่ปอดมีจำนวนมากที่สุด แต่ส่วนอื่นของร่างกายก็หนีไม่พ้นเหมือนกัน

เด็กที่กินน้ำนมสัดวัยมักจะติดโรคจากตัวสัดวันี้และมีอาการเป็นทุเบอร์คุโลสิสในลำไส้ แต่ในเมืองไทยเราไม่ใช่จะใช้น้ำนมสัดวัย เรายังกินไม่ได้ваไปคนมีมากหรือน้อย แต่ถ้าใช้น้ำนมที่อุ่นจนเข้มข้นแล้วเชื่อโรคก็หาย

เด็กเล็กๆ มักจะเป็นที่เรียกวันว่าฝูงหนู โกรคนี้คือโกรทุเบอร์คุโลสิตในต่อม มีอาการเป็นเม็ดแข็งสักเท่าฝูกระยะที่คอก เมื่อฝีแಡกเกิมโน้มให้ติดในหลังและหางของอ่อนเมื่อรวมด้า แต่เพราไม่เชื้อโกรอยู่ในน้ำหนอน น้ำหนอนคงไปที่ไทนก็อาจทำให้เกิดแพลงในม้าได้ ควรผ่าเสียเมื่อเม็ดยังไม่แตก ไม่เป็นโกรอย่างร้ายขันได้

คนหลังโกรหลังค่อมมีมาแต่โบราณ โดยมากคนเหล่านี้ได้เคยเป็นโกรทุเบอร์คุโลสิตในกระดูกสันหลังเชื้อโกรทำให้กระดูกยื่นไปข้างหนึ่ง จึงทำให้กระดูกสันหลังทั้งอันเอ็นไป แต่มักจะไม่ถึงแก่ความตาย

ทุเบอร์คุโลสิตในเยื่อหุ้มมันสมองก็เป็นได้ มีอาการเป็นไข้อ่อนแรง แล้วมักจะไม่รอดเลย เด็กเป็นมากผู้ใหญ่ไม่ใช่จะเป็น

โกรนี้ในติดและกระเพาะเปาไม่โกรร์ม ถ้ามีแล้วควรได้โดยหาเชื้อโกรในปัสสาวะ

โกรทุเบอร์คุโลสิตที่อื่นก็ไม่สำคัญเท่าที่ปอด เพราจะนั้นถ้ากระทำการป้องกันโกรที่ปอดแล้วโกรที่อื่นก็จะหายไปด้วย

ท่านผู้ใดอุสานเสียเวลาข่านหนังสือจะบันนี้มานานถึงที่นี่ก็คงจะเห็นด้วยว่าเราควรจะกำจัดโกรอันร้ายนี้เสียเพราเป็นโกรที่ร้ายสำหรับบ้านเมือง โดยมากมักจะเป็นแก่เด็กเล็กๆ ที่กำลังน่าเอ็นดู หรือไม่ก็กำลังเป็นหนูนูนเป็นสาวอาเจงานเอกสาร เป็นข้าศึกที่ตัดกำลังราชภูรของเรามาก ถ้าท่านมีน้ำใจจะช่วยแล้ว ขอให้ลงมือช่วยทันที

วิธีช่วยมีดังนี้

(๑) ขอให้ท่านพยายามประพฤติตัวของท่านให้มีกำลังแข็งแรงจะได้มีกำลังพรักพร้อมโดยต่อสู้ในเมื่อเชื้อโกรจะเข้ามาหาท่าน และเมื่อท่านถูกเชื้อโกรเข้ามาตีแล้วก็พยายามดึงกองหัวสู้ด้วยที่ได้อธิบายมาแล้วนี้

(๒) ถ้าท่านยังไม่เข้าใจ อย่างงเสีย ภารผู้ที่เป็นแพทย์ประจำคนียบัตร อย่าไปปกภารผู้ที่ไม่รู้จักและอย่าเสียเงินเจียดยากลงบ้าน จงขอให้แพทย์ตั้งยาให้ถึงจะเสียเงินมากกว่า เขาเก็บจะให้ยาที่ถูกโกรท่าน เพราเขาได้ตัวจากท่านแล้ว เขายังจะให้ยา ถึงยานั้นจะไม่ถูกแก้โกรคลายพิชัย เขายังต้องให้ยาแก้ ถ้าหากลงบ้านเป็นพิษแล้วท่านจะไปเอายาแก้กับใคร ถ้าท่านเจบลงหามอดีไม่เสียเงินท่านจะมีทางขอมากกว่ากินยาคนที่ไม่ใช่หมอบอก ท่านต้องระวังตัวเพราจะชีวิตของท่านมีราคาไม่อะเพียงแต่สำหรับตัวท่านคนเดียว สำหรับญาติของท่านทุกคนและสำหรับบ้านเมืองด้วย คนไทยที่มีกำลังกายและกำลังปัญญาบริบูรณ์ยอมเป็นทรัพย์อันประเสริฐของชาติ เพราจะนั้นรักษาดูแลท่านจึงได้ตั้งกรมสาธารณสุขขึ้นสำหรับบำรุงราชภูรไทย

กรมสาธารณสุข

๔ กันยายน ๒๕๗๑